

22.12.2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年 1 2 月 2 6 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 4 3 1 9 0 8  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P 2 0 0 3 - 4 3 1 9 0 8 ]

REC'D 20 JAN 2005

WIPO                      PCT


出      願      人                      住友化学株式会社  
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 1 月 1 0 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 P156596  
【提出日】 平成15年12月26日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 A01N 29/02  
A01N 37/34 101  
C07C 19/10  
C07C255/04

【発明者】  
【住所又は居所】 兵庫県宝塚市高司四丁目 2 番 1 号 住友化学工業株式会社内  
【氏名】 大平 大輔

【発明者】  
【住所又は居所】 兵庫県宝塚市高司四丁目 2 番 1 号 住友化学工業株式会社内  
【氏名】 大高 健

【特許出願人】  
【識別番号】 000002093  
【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】  
【識別番号】 100093285  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 久保山 隆  
【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】  
【識別番号】 100113000  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 中山 亨  
【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】  
【識別番号】 100119471  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 榎本 雅之  
【電話番号】 06-6220-3405


【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 010238  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0212949

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

式 (I)



〔式中、RはC1-C4フルオロアルキル基を表し、  
Qはハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-C6アルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルキニル基又はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7シクロアルキル基又はハロゲン原子で置換されていてもよい(C3-C7シクロアルキル)C1-C4アルキル基を表す。〕  
で示されるニトリル化合物。

## 【請求項 2】

RがC2フルオロアルキル基である請求項1記載のニトリル化合物。

## 【請求項 3】

Qがハロゲン原子で置換されていてもよいC4アルキル基である請求項1～2いずれか一項記載のニトリル化合物。

## 【請求項 4】

請求項1～3いずれか一項記載のニトリル化合物を有効成分として含有することを特徴とする有害生物防除剤。

## 【請求項 5】

請求項1～3いずれか一項記載のニトリル化合物の有効量を有害生物又は有害生物の生育場所に施用することを特徴とする有害生物の防除方法。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】ニトリル化合物ならびにその有害生物防除用途

## 【技術分野】

【0001】

本発明は、フルオロアルキル基を含有するニトリル化合物ならびにその有害生物防除用途に関する。

## 【背景技術】

【0002】

従来から、昆虫、ダニ及び線虫等の有害生物の防除を目的とする化合物ならびにそれらの化合物による防除方法が提供されている。しかしながら、場合によりそれらの化合物が十分な効力を示さないことがある。

また、ある種のフルオロアルキル基を含有するニトリル化合物が、抗てんかん剤の成分化合物の製造中間体として知られている。

【0003】

【特許文献1】特開平4-21652号公報。

【0004】

【特許文献2】特開平6-116200号公報。

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

【0005】


本発明は、有害生物に対して優れた防除効力を有する化合物ならびにその化合物の有害生物防除用途を提供することを課題とする。

## 【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者等は、優れた有害生物防除効力を有する化合物を見出すべく鋭意検討を重ねた結果、下記式(I)で示されるニトリル化合物が昆虫並びにダニ等の節足動物及び線虫等の有害生物に対して優れた防除活性を有することを見出し本発明に至った。

即ち、本発明は、式(I)



〔式中、RはC1-C4フルオロアルキル基を表し、Qはハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-C6アルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルキニル基又はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7シクロアルキル基又はハロゲン原子で置換されていてもよい(C3-C7シクロアルキル)C1-C4アルキル基を表す。〕で示されるニトリル化合物(以下、本発明化合物と記す)、本発明化合物を有効成分として含有することを特徴とする有害生物防除剤及び本発明化合物の有効量を有害生物または有害生物の生息場所に施用することを特徴とする有害生物の防除方法を提供する。

## 【発明の効果】

【0007】

本発明により、昆虫、ダニ及び線虫等の有害生物を効果的に防除することができる。

## 【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

本発明において、

ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子を表し、

“C1-C6アルキル基”という表記は、全炭素数が1から6であるアルキル基を表し、

“C1-C4フルオロアルキル基”という表記は、対応する水素原子の全てあるいは一部がフッ素原子で置換されており、かつ全炭素数が1から4であるアルキル基を表し、

“C3-C7シクロアルキル”における“C3-C7”という表記は、環構造を構成する炭素原子と環構造を構成する炭素原子に結合するアルキル基の炭素原子とを合わせた全炭素数が3から7であることを表す。

**【0009】**

Rで示されるC1-C4アルキル基としては、例えばトリフルオロメチル基、1-モノフルオロエチル基、2-モノフルオロエチル基、1, 1-ジフルオロエチル基、2, 2-ジフルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基、1, 2, 2, 2-テトラフルオロエチル基、1, 1, 2, 2, 2-ペンタフルオロエチル基等のC1-C2フルオロアルキル基；

**【0010】**

2-フルオロプロピル基、3-フルオロプロピル基、1, 1-ジフルオロプロピル基、2, 2-ジフルオロプロピル基、2, 3-ジフルオロプロピル基、3, 3-ジフルオロプロピル基、1, 2, 2-トリフルオロプロピル基、2, 2, 3-トリフルオロプロピル基、3, 3, 3-トリフルオロプロピル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基、2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル基、1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル基等のC3フルオロアルキル基；

**【0011】**

1-フルオロブチル基、2-フルオロブチル基、3-フルオロブチル基、4-フルオロブチル基、1, 1-ジフルオロブチル基、2, 2-ジフルオロブチル基、2, 3-ジフルオロブチル基、2, 4-ジフルオロブチル基、3, 3-ジフルオロブチル基、4, 4-ジフルオロブチル基、1, 2, 2-トリフルオロブチル基、2, 2, 3-トリフルオロブチル基、3, 3, 4-トリフルオロブチル基、3, 4, 4-トリフルオロブチル基、4, 4, 4-トリフルオロブチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロブチル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロブチル基、3, 3, 4, 4-テトラフルオロブチル基、3, 4, 4, 4-テトラフルオロブチル基、3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基等のC4フルオロアルキル基が挙げられる。

**【0012】**

Qで示されるハロゲン原子で置換されていてもよいC1-C6アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、2-メチルプロピル基、1, 1-ジメチルエチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、3, 3-ジメチルブチル基、

**【0013】**

モノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、モノクロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、モノブロモメチル基、1-モノフルオロエチル基、2-モノフルオロエチル基、1-モノクロロエチル基、2-モノクロロエチル基、1-モノブロモエチル基、2-モノブロモエチル基、1, 1-ジフルオロエチル基、2, 2-ジフルオロエチル基、1, 2, 2-トリフルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基、1, 1, 2, 2, 2-ペンタフルオロエチル基、2-クロロ-1-メチルエチル基、1-フルオロプロピル基、2-フルオロプロピル基、3-フルオロプロピル基、3-クロロプロピル基、3-ブロモプロピル基、1, 1-ジフルオロプロピル基、2, 2-ジフルオロプロピル基、3, 3-ジフルオロプロピル基、2, 3, 3-トリフルオロプロピル基、3, 3, 3-トリフルオロプロピル基、3-クロロ-3, 3-ジフルオロプロピル基、3, 3-ジクロロ-3-フルオロプロピル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル基、1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロピル基、2-クロロ-3-ブロモ-2, 3, 3-トリフルオロプロピル基、3-ブロモ-2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基、2

, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロピル基、

【0014】

4-フルオロブチル基、4-クロロブチル基、4-ブロモブチル基、2-フルオロブチル基、2-ジフルオロブチル基、3-フルオロブチル基、3, 3-ジフルオロブチル基、4, 4-ジフルオロブチル基、2, 2, 3-トリフルオロブチル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロブチル基、2, 2, 3, 4-テトラフルオロブチル基、3, 3, 4, 4-テトラフルオロブチル基、3-クロロ-3, 4, 4-トリフルオロブチル基、3-クロロ-4-ブロモ-3, 4, 4-トリフルオロブチル基、3, 4-ジクロロ-3, 4, 4-トリフルオロブチル基、2, 2, 3, 4, 4-ペンタフルオロブチル基、2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル基、3, 4, 4, 4-テトラフルオロ-3-(トリフルオロメチル)ブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基、

【0015】

5-フルオロペンチル基、5-クロロペンチル基、5-ブロモペンチル基、2-フルオロペンチル基、2-クロロペンチル基、2, 2-ジフルオロペンチル基、2, 3-ジフルオロペンチル基、2, 2-ジクロロペンチル基、2, 3-ジクロロペンチル基、3, 4-ジフルオロペンチル基、3, 4-ジクロロペンチル基、2, 2, 3-トリフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4-ペンタフルオロフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5-ヘプタフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル基、3-フルオロペンチル基、3-クロロペンチル基、3, 3-ジフルオロペンチル基、3, 3-ジクロロペンチル基、3, 3, 4-トリフルオロペンチル基、

【0016】

3, 3, 4, 4-テトラフルオロペンチル基、3, 3, 4, 4, 5-ペンタフルオロペンチル基、3, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル基、3, 4, 4, 5, 5-ペンタフルオロペンチル基、3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロペンチル基、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロペンチル基、4-フルオロペンチル基、4, 4-ジフルオロペンチル基、4, 4, 5-トリフルオロペンチル基、4, 4, 5, 5-テトラフルオロペンチル基、4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンチル基、5, 5-ジフルオロペンチル基、5, 5, 5-トリフルオロペンチル基、

【0017】

6-フルオロヘキシル基、6-クロロヘキシル基、6-ブロモヘキシル基、2, 2-ジフルオロヘキシル基、3-フルオロヘキシル基、3, 3-ジフルオロヘキシル基、4-フルオロヘキシル基、4, 4-ジフルオロヘキシル基、5, 5-ジフルオロヘキシル基、2, 2, 3-トリフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4-ペンタフルオロフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5-ヘプタフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6-ノナフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-デカフルオロヘキシル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ウンデカフルオロヘキシル基、3-フルオロヘキシル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ドデカフルオロヘキシル基、3, 3-ジフルオロヘキシル基、3, 3, 4-トリフルオロヘキシル基、3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロヘキシル基、3, 3, 4, 4, 5-ペンタフルオロヘキシル基、3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロヘキシル基、3, 3, 4, 4, 5, 5, 6-ヘプタフルオロヘキシル基、4-フルオロヘキシル基、4, 4-ジフルオロヘキシル基、4, 4, 5-トリフルオロヘキシル基、4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロヘキシル基、4, 4, 5, 5, 6-ペンタフルオロヘキシル基、4, 4, 5, 5, 6, 6-ヘキサフルオロヘキシル基、4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ヘプタフルオロヘキシル基、

、5-フルオロヘキシル基、5, 5-ジフルオロヘキシル基、5, 5, 6-トリフルオロヘキシル基、5, 5, 6, 6-ヘキサフルオロヘキシル基、5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキシル基、6, 6-ジフルオロヘキシル基、6, 6, 6-トリフルオロヘキシル基が挙げられる。

**【0018】**

Qで示されるハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、1-プロペニル基、2-メチル-1-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、3-ブテニル基、2-ブテニル基、1-ブテニル基、3-メチル-2-ブテニル基、4-ペンテニル基、3-ペンテニル基、2-ペンテニル基、1-ペンテニル基、4-メチル-3-ペンテニル基、5-ヘキセニル基、4-ヘキセニル基、3-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基、1-ヘキセニル基、

**【0019】**

1-フルオロビニル基、2-フルオロビニル基、1-クロロビニル基、2-クロロビニル基、2, 2-ジフルオロビニル基、2, 2-ジクロロビニル基、2, 2-ジブロモビニル基、2, 3, 3-トリフルオロ-2-プロペニル基、3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペニル基、4, 4-ジブromo-3-ブテニル基、3, 4, 4-トリフルオロ-3-ブテニル基、4, 4, 4-トリフルオロ-2-ブテニル基、5, 5-ジフルオロ-4-ペンテニル基、4, 5, 5-トリフルオロ-4-ペンテニル基、5, 5, 5-トリフルオロ-3-ペンテニル基、6, 6-ジフルオロ-5-ヘキセニル基、5, 6, 6-トリフルオロ-5-ヘキセニル基、6, 6, 6-トリフルオロ-4-ヘキセニル基が挙げられる。

**【0020】**

Qで示されるハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルキニル基としては例えばエチニル基、1-プロピニル基、2-プロピニル基、1-ブチニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、1-ペンチニル基、2-ペンチニル基、3-ペンチニル基、4-ペンチニル基、1-ヘキシニル基、2-ヘキシニル基、3-ヘキシニル基、4-ヘキシニル基、5-ヘキシニル基、4, 4, 4-トリフルオロ-2-ブチニル基及び3-クロロ-2-プロピニル基が挙げられる。

**【0021】**

Qで示されるハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7シクロアルキル基としては、例えばシクロプロピル基、1-メチルシクロプロピル基、2-メチルシクロプロピル基、2, 2-ジメチルシクロプロピル基、2, 3-ジメチルシクロプロピル基、2, 2, 3-トリメチルシクロプロピル基、2, 2, 3, 3-テトラメチルシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、1-フルオロシクロプロピル基、2-フルオロシクロプロピル基、2, 2-ジフルオロシクロプロピル基、2, 2, 3-トリフルオロシクロプロピル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロシクロプロピル基、2, 2-ジクロロシクロプロピル基及び2, 2, 3, 3-テトラクロロシクロプロピル基が挙げられる。

**【0022】**

Qで示されるハロゲン原子で置換されていてもよい(C3-C7シクロアルキル)C1-C4アルキル基としては、例えばシクロプロピルメチル基、2-(シクロプロピル)エチル基、3-(シクロプロピル)プロピル基、(1-メチルシクロプロピル)メチル基、2-(1-メチルシクロプロピル)エチル基、3-(1-メチルシクロプロピル)プロピル基、シクロブチルメチル基、2-(シクロブチル)エチル基、3-(シクロブチル)プロピル基、(2-フルオロシクロプロピル)メチル基、1-(2-フルオロシクロプロピル)エチル基、2-(1-フルオロシクロプロピル)エチル基、2-(2-フルオロシクロプロピル)エチル基、(2, 2-ジフルオロシクロプロピル)メチル基、2-(2, 2-ジフルオロシクロプロピル)エチル基、1-(2, 2-ジフルオロシクロプロピル)エチル基、(2, 2, 3, 3-テトラフルオロシクロプロピル)メチル基、(2, 2-ジクロロシクロプロピル)メチル基、2-(2, 2-ジクロロシクロプロピル)エチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、1-(2, 2, 3-トリフルオロシク

ロプロピル) エチル基、1-(2, 2, 3, 3-テトラフルオロシクロプロピル) エチル基、4-(シクロプロピル) ブチル基、3-(シクロプロピル) ブチル基、2-(シクロプロピル) ブチル基、4-(1-フルオロシクロプロピル) ブチル基、4-(2-フルオロシクロプロピル) ブチル基、4-(2, 2-ジフルオロシクロプロピル) ブチル基、4-(2, 2, 3-トリフルオロシクロプロピル) ブチル基及び4-(2, 2, 3, 3-テトラフルオロシクロプロピル) ブチル基が挙げられる。

**【0023】**

本発明化合物の態様としては、例えば以下の化合物が挙げられる。

式(I)において、Rが2, 2, 2-トリフルオロエチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rがフッ素原子3～5個を有するC2-C4フルオロアルキル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rがフッ素原子6～8個を有するC3-C4フルオロアルキル基であるニトリル化合物；

**【0024】**

式(I)において、Rがトリフルオロメチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、RがC2フルオロアルキル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2-ジフルオロエチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 2, 2, 2-テトラフルオロエチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 2, 2-ペンタフルオロエチル基であるニトリル化合物；

**【0025】**

式(I)において、RがC3フルオロアルキル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2-ジフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが3, 3, 3-トリフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 2-テトラフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル基であるニトリル化合物；

**【0026】**

式(I)において、RがC4フルオロアルキル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2-ジフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 2, 2-トリフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2, 3-トリフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが1, 1, 2, 2-テトラフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2, 3, 3-テトラフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式(I)において、Rが2, 2, 3, 3, 4, 4-ヘキサフルオロブチル基であるニトリル化合物；



式 (I) において、R が 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

【0027】

式 (I) において、Q がハロゲン原子であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が臭素原子であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が塩素原子であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がフッ素原子であるニトリル化合物;

【0028】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 1-C 6 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 1 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がモノフルオロメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がジフルオロメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がトリフルオロメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がモノクロロメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がジクロロメチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がモノプロモメチル基であるニトリル化合物;

【0029】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 2 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1-ジメチルエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1-モノクロロエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-モノクロロエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-モノプロモエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-モノフルオロエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2-ジフルオロエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 2-トリフルオロエチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基であるニトリル化合物;

;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 2, 2-ペンタフルオロエチル基であるニトリル化合物;

【0030】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 3 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がイソプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-クロロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-クロロ-2-プロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-フルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-プロモプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 3-ジクロロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 3-ジフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 3-トリフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

【0031】

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル基であるニトリル

化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-クロロ-3-ブロモ-2, 3, 3-トリフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-ブロモ-2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-(トリフルオロメチル)-2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロピル基であるニトリル化合物;

#### 【0032】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C4 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がイソブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4-クロロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4, 4, 4-トリフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4-ブロモ-3-クロロ-3, 4, 4-トリフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4-ブロモ-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-(トリフルオロメチル)-3, 4, 4, 4-テトラフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基であるニトリル化合物;

#### 【0033】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C5 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がイソペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 5, 5, 5-トリフルオロペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル基であるニトリル化合物;

#### 【0034】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C6 アルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がイソヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 6, 6, 6-トリフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 5, 5, 6, 6, 6-ペンタフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ヘプタフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-オクタフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ドデカフルオロヘキシル基であるニトリル化合物;

#### 【0035】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 2-C 6 アルケニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよいビニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がビニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1-メチルビニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1-プロペニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-プロペニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 3, 3-トリフルオロ-2-プロペニル基であるニトリル化合物;

#### 【0036】

式 (I) において、Q が 1-ブテニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-ブテニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-メチル-2-ブテニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 4, 4, 4-トリフルオロ-2-ブテニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3-ブテニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 4, 4-トリフルオロ-3-ブテニル基であるニトリル化合物;

#### 【0037】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 2-C 6 アルキニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がエチニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 1-プロピニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロピニル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2-プロピニル基であるニトリル化合物;

#### 【0038】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 3-C 7 シクロアルキル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよいシクロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がシクロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q が 2, 2-ジシクロシクロプロピル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよいシクロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がシクロブチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよいシクロペンチル基であるニトリル化合物;

式 (I) において、Q がシクロペンチル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよいシクロヘキシル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がシクロヘキシル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい (C3-C7 シクロアルキル) C1-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

【0039】

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q が 6～8 個のフッ素原子を有する C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、Q が 6～8 個のフッ素原子を有する C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

【0040】

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6～8 個を有する C3-C4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6～8 個を有する C3-C4 フルオロアルキル基であり、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q が 6～8 個のフッ素原子を有する C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6～8 個を有する C3-C4 フルオロアルキル基であり、Q が 6～8 個のフッ素原子を有する C4-C6 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6～8 個を有する C3-C4 フルオロアルキル基であり、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q が 6～8 個のフッ素原子を有する C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6～8 個を有する C3-C4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 3～5 個を有する C2-C4 フルオロアルキル基であり、Q がフッ素原子で置換されていてもよい C3-C4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R がフッ素原子 6 ～ 8 個を有する C 3 - C 4 フルオロアルキル基であり、Q が 6 ～ 8 個のフッ素原子を有する C 3 - C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

【0041】

式 (I) において、R が C 2 - C 4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 1 - C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 2 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 1 - C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が 2, 2, 2-トリフルオロエチル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 1 - C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 2 - C 4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 2 - C 4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 2 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい C 4 アルキル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 2 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基であるニトリル化合物；

式 (I) において、R が C 4 フルオロアルキル基であり、Q がハロゲン原子で置換されていてもよい 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロブチル基であるニトリル化合物；

【0042】


次に本発明化合物の製造法について説明する。

本発明化合物は例えば、以下の（製造法 1）、（製造法 2）又は（製造法 3）にしたがって製造することができる。

【0043】

（製造法 1）

本発明化合物は、化合物（a）と化合物（b）とを反応させることにより製造することができる。



[式中、R 及び Q は前記と同じ意味を表し、X<sup>1</sup> は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、メタンスルホニルオキシ基、トルエンスルホニルオキシ基又はトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表す。]

該反応は、通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、1, 4-ジオキサン等のエーテル類、N, N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド等のジアルキルスルホキシド類及びこれらの混合物が挙げられる。

反応に用いられる塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩、水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物及びトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンが挙げられる。

反応に用いられる化合物（a）の量は、化合物（b）1 モルに対して通常 1 ～ 10 モルの割合である。

反応に用いられる塩基の量は、化合物 (b) 1 モルに対して通常 1 ～ 10 モルの割合である。


該反応の反応温度は通常  $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$  の範囲であり、反応時間は通常 0.1 ～ 24 時間の範囲である。

反応終了後は、反応混合物を水に注加し、有機溶媒抽出して得られた有機層を、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、本発明化合物を単離することができる。単離した本発明化合物は必要に応じてクロマトグラフィー、再結晶等の操作により精製することもできる。

#### 【0044】

(製造法 2)

本発明化合物は、化合物 (c) と化合物 (d) とを反応させることにより製造することができる。



[式中、R 及び Q は前記と同じ意味を表し、 $\text{X}^2$  は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、メタンスルホニルオキシ基、トルエンスルホニルオキシ基又はトリフルオロメタンスルホニルオキシ基を表す。]

該反応は、通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、メチル tert-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル類、N,N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド等のジアルキルスルホキシド類及びこれらの混合物が挙げられる。

反応に用いられる塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩、水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物及びトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンが挙げられる。

反応に用いられる化合物 (d) の量は、化合物 (c) 1 モルに対して通常 1 ～ 10 モルの割合である。

反応に用いられる塩基の量は、化合物 (c) 1 モルに対して通常 1 ～ 10 モルの割合である。


該反応の反応温度は通常  $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$  の範囲であり、反応時間は通常 0.1 ～ 24 時間の範囲である。

反応終了後は、反応混合物を水に注加し、有機溶媒抽出して得られた有機層を、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、本発明化合物を単離することができる。単離した本発明化合物は必要に応じてクロマトグラフィー、再結晶等の操作により精製することもできる。

#### 【0045】

(製造法 3)

本発明化合物のうち、Q が R と同一の C1-C4 フルオロアルキル基である化合物 (I) は、化合物 (e) とマロノニトリルとを反応させることにより製造することもできる。



[式中、 $\text{R}^1$  及び  $\text{Q}^1$  は同一の C1-C4 フルオロアルキル基を表し、 $\text{X}^3$  は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、トルエンスルホニル基、トリフルオロメタンスルホニル基を表す。]

該反応は、通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル類、N,N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシド等のジアルキルスルホキシド類及びこれらの混合物が挙げられる。

反応に用いられる塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩、水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物及びトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンが挙げられる。

反応に用いられる試剤の量は、化合物 (e) 1 モルに対して、マロノニトリルが通常 0.3 ~ 1 モルの割合であり、塩基が通常 0.6 ~ 5 モルの割合である。


該反応の反応温度は通常 -20 ~ 100 °C の範囲であり、反応時間は通常 0.1 ~ 36 時間の範囲である。

反応終了後は、反応混合物を水に注加し、有機溶媒抽出して得られた有機層を、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物 (II) を単離することができる。単離した化合物 (II) は必要に応じてクロマトグラフィー、再結晶等の操作により精製することもできる。

#### 【0046】

次に本発明化合物の製造中間体の製造について説明する。

化合物 (b) は、例えば化合物 (d) とマロノニトリルとを反応させることにより製造することができる。



[式中、Q 及び  $\text{X}^2$  は前記と同じ意味を表す。]

該反応は、通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、メチル-tert-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル類、N,N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類及びこれらの混合物が挙げられる。

反応に用いられる塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩、水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物及びトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンが挙げられる。


反応に用いられる試剤の量は、化合物 (d) 1 モルに対して、マロノニトリルが通常 1 ~ 10 モルの割合であり、塩基が通常 0.5 ~ 5 モルの割合である。

該反応の反応温度は通常 -20 ~ 100 °C の範囲であり、反応時間は通常 0.1 ~ 24 時間の範囲である。

反応終了後は、反応混合物を水に注加し、有機溶媒抽出して得られた有機層を、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物（b）を単離することができる。単離した化合物（b）は必要に応じてクロマトグラフィー、再結晶等の操作により精製することもできる。

【 0 0 4 7 】

化合物(c)は、例えば化合物(a)とマロノニトリルとを反応させることにより製造することができる。



〔式中、R及びX<sup>1</sup>は前記と同じ意味を表す。〕

該反応は、通常溶媒中、通常塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、メチルtert-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル類、N,N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド類及びこれらの混合物が挙げられる。

反応に用いられる塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩、水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物及びトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンが挙げられる。

反応に用いられる試剤の量は、化合物 (a) 1 モルに対して、マロノニトリルが通常 1 ~ 10 モルの割合であり、塩基が通常 0.5 ~ 5 モルの割合である。

該反応の反応温度は通常 $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$ の範囲であり、反応時間は通常 $0.1 \sim 24$ 時間の範囲である。

反応終了後は、反応混合物を水に注加し、有機溶媒抽出して得られた有機層を、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物（c）を単離することができる。単離した化合物（c）は必要に応じてクロマトグラフィー、再結晶等の操作により精製することもできる。

【 0 0 4 8 】

【0048】  
また、化合物(c)はJ. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 2589-2592 (1991)に記載された方法により製造することもできる。

【 0 0 4 9 】

【0049】  
本発明化合物が防除効力を示す有害生物としては、例えば昆虫並びにダニ等の節足動物及び線虫が挙げられる。より具体的には例えば下記のもの挙げられる。

【 0 0 5 0 】

半翅目害虫：ヒメトビウンカ (*Laodelphax striatellus*)、トビイロウンカ (*Nilaparvata lugens*)、セジロウンカ (*Sogatella furcifera*) 等のウンカ類、ツマグロヨコバイ (*Nephotettix cincticeps*)、タイワンツマグロヨコバイ (*Nephotettix virescens*) 等のヨコバイ類、ワタアブラムシ (*Aphis gossypii*)、モモアカアブラムシ (*Myzus persicae*) 等のアブラムシ類、アオクサカメムシ (*Nezara antennata*)、ホソヘリカメムシ (*Riptortus clavatus*)、オオトゲシラホシカメムシ (*Eysarcoris lewisi*)、トゲシラホシカメムシ (*Eysarcoris parvus*)、チャバネアオカメムシ (*Plautia stali*)、クサギカメムシ (*Halyomorpha mista*) 等のカメムシ類、オンシツコナジラミ (*Trialeurodes vaporariorum*)、シルバーリーフコナジラミ (*Bemisia argentifolii*) 等のコナジラミ類、アカマルカイガラムシ (*Aonidiella aurantii*)、サンホーゼカイガラムシ (*Comstockaspis perniciosus*)、シトラススノースケール (*Unaspis citri*)、ルビーロウムシ (*Ceroplastes rubens*)、イセリヤカイガラムシ (*Icerya purchasi*) 等のカイガラムシ類、ゲンバイムシ



類、キジラミ類等；

【0051】

鱗翅目害虫：ニカメイガ (*Chilo suppressalis*)、コブノメイガ (*Cnaphalocrocis medinalis*)、ワタノメイガ (*Notarcha derogata*)、ノシメマダラメイガ (*Plodia interpunctella*) 等のメイガ類、ハスモンヨトウ (*Spodoptera litura*)、アワヨトウ (*Pseudaletia separata*)、トリコプルシア属、ヘリオティス属、ヘリコベルパ属等のヤガ類、モンシロチョウ (*Pieris rapae*) 等のシロチョウ類、アドキソフィエス属、ナシヒメシンクイ (*Grapholita molesta*)、コドリンガ (*Cydia pomonella*) 等のハマキガ類、モモシンクイガ (*Carposina niponensis*) 等のシンクイガ類、リオネティア属等のハモグリガ類、リマントリア属、ユーブロクティス属等のドクガ類、コナガ (*Plutella xylostella*) 等のスガ類、ワタアカミムシ (*Pectinophora gossypiella*) 等のキバガ類、アメリカシロヒトリ (*Hyphantria cunea*) 等のヒトリガ類、イガ (*Tinea translucens*)、コイガ (*Tineola bisselliella*) 等のヒロズコガ類等；

【0052】

双翅目害虫：アカイエカ (*Culex pipiens pallens*)、コガタアカイエカ (*Culex tritaeniorhynchus*)、ネッタイエカ (*Culex quinquefasciatus*) 等のイエカ類、ネッタイシマカ (*Aedes aegypti*)、ヒトスジシマカ (*Aedes albopictus*) 等のエーデス属、(*Anopheles sinensis*) 等のアノフェレス属、ユスリカ類、イエバエ (*Musca domestica*)、オオイエバエ (*Muscina stabulans*) 等のイエバエ類、クロバエ類、ニクバエ類、ヒメイエバエ類、タネバエ (*Delia platura*)、タマネギバエ (*Delia antiqua*) 等のハナバエ類、ミバエ類、ショウジョウバエ類、チョウバエ類、ブユ類、アブ類、サシバエ類、ハモグリバエ類等；

【0053】

鞘翅目害虫：ウエスタンコーンルーツワーム (*Diabrotica virgifera virgifera*)、サザンコーンルーツワーム (*Diabrotica undecimpunctata howardi*) 等のコーンルーツワーム類、ドウガネブイブイ (*Anomala cuprea*)、ヒメコガネ (*Anomala rufocuprea*) 等のコガネムシ類、メイズウイービル (*Sitophilus zeamais*)、イネミズゾウムシ (*Lissorhoptrus oryzophilus*)、アズキゾウムシ (*Callosobruchus chinensis*) 等のゾウムシ類、チャイロコメノゴミムシダマシ (*Tenebrio molitor*)、コクヌストモドキ (*Tribolium castaneum*) 等のゴミムシダマシ類、イネドロオイムシ (*Oulema oryzae*)、ウリハムシ (*Aulacophora femoralis*)、キスジノミハムシ (*Phyllotreta striolata*)、コロラドハムシ (*Leptinotarsa decemlineata*) 等のハムシ類、シバンムシ類、ニジュウヤホシテントウ (*Epidachna vigintioctopunctata*) 等のエビラクナ類、ヒラタキクイムシ類、ナガシンクイムシ類、カミキリムシ類、アオバアリガタハネカクシ (*Paederus fuscipes*) 等。

ゴキブリ目害虫：チャバネゴキブリ (*Blattella germanica*)、クロゴキブリ (*Periplaneta fuliginosa*)、ワモンゴキブリ (*Periplaneta americana*)、トビイロゴキブリ (*Periplaneta brunnea*)、トウヨウゴキブリ (*Blatta orientalis*) 等；

【0054】

アザミウマ目害虫：ミナミキイロアザミウマ (*Thrips palmi*)、ネギアザミウマ (*Thrips tabaci*)、ミカンキイロアザミウマ (*Frankliniella occidentalis*)、ヒラズハナアザミウマ (*Frankliniella intonsa*) 等；

膜翅目害虫：アリ類、スズメバチ類、アリガタバチ類、ニホンカブラバチ (*Athalia japonica*) 等のハバチ類等；

直翅目害虫：ケラ類、バッタ類等；

隠翅目害虫：ネコノミ (*Ctenocephalides felis*)、イヌノミ (*Ctenocephalides canis*)、ヒトノミ (*Pulex irritans*)、ケオプスネズミノミ (*Xenopsylla cheopis*) 等。

シラミ目害虫：コロモジラミ (*Pediculus humanus corporis*)、ケジラミ (*Phthirus pubis*)、ウシジラミ (*Haematopinus eurysternus*)、ヒツジジラミ (*Dalmanella ovis*) 等；

シロアリ目害虫：ヤマトシロアリ (*Reticulitermes speratus*)、イエシロアリ (*Coptotermes formosanus*) 等；

## 【0055】

ダニ目害虫: ナミハダニ (*Tetranychus urticae*)、カンザワハダニ (*Tetranychus kanzawai*)、ミカンハダニ (*Panonychus citri*)、リンゴハダニ (*Panonychus ulmi*)、オリゴニカス属等のハダニ類、ミカンサビダニ (*Aculops pelekassi*)、リンゴサビダニ (*Aculus schlechtendali*) 等のフシダニ類、チャノホコリダニ (*Polyphagotarsonemus latus*) 等のホコリダニ類、ヒメハダニ類、ケナガハダニ類、フタトゲチマダニ (*Haemaphysalis longicornis*)、ヤマトチマダニ (*Haemaphysalis flava*)、タイワンカクマダニ (*Dermacentor taiwanicus*)、ヤマトマダニ (*Ixodes ovatus*)、シュルツマダニ (*Ixodes persulcatus*)、オウシマダニ (*Boophilus microplus*) 等のマダニ類、ケナガコナダニ (*Tyrophagus putrescentiae*) 等のコナダニ類、コナヒョウヒダニ (*Dermatophagoides farinae*)、ヤケヒョウヒダニ (*Dermatophagoides pteromyssus*) 等のヒョウヒダニ類、ホソツメダニ (*Cheyletus eruditus*)、クワガタツメダニ (*Cheyletus malaccensis*)、ミナミツメダニ (*Cheyletus moorei*) 等のツメダニ類、ワクモ類等;

## 【0056】

クモ類: カバキコマチグモ (*Chiracanthium japonicum*)、セアカゴケグモ (*Latrodectus hasseltii*) 等;  
唇脚綱類: ゲジ (*Thereuonema hilgendorfi*)、トビズムカデ (*Scolopendra subspinipes*) 等;  
倍脚綱類: ヤケヤスデ (*Oxidus gracilis*)、アカヤスデ (*Nedyopus tambanus*) 等;  
等脚目類: オカダンゴムシ (*Armadillidium vulgare*) 等;  
腹足綱類: チャコウラナメクジ (*Limax marginatus*)、キイロコウラナメクジ (*Limax flavus*) 等;  
線虫類: ミナミネグサレセンチュウ (*Pratylenchus coffeae*)、キタネグサレセンチュウ (*Pratylenchus fallax*)、ダイズシストセンチュウ (*Heterodera glycines*)、ジャガイモシストセンチュウ (*Globodera rostochiensis*)、キタネコブセンチュウ (*Meloidogyne hapla*)、サツマイモネコブセンチュウ (*Meloidogyne incognita*) 等。

## 【0057】

本発明の有害生物防除剤は本発明化合物そのものであってもよいが、一般的には、本発明化合物と、固体担体、液体担体及び/又はガス状担体とを混合し、更に必要に応じて界面活性剤その他の製剤用補助剤を添加して得られる製剤である。製剤としては、例えば乳剤、油剤、シャンプー剤、フロアブル剤、粉剤、水和剤、粒剤、ペースト状製剤、マイクロカプセル製剤、泡沫剤、エアゾール製剤、炭酸ガス製剤、錠剤、樹脂製剤等の形態があげられ、これらの製剤は、毒餌、殺虫線香、電気殺虫マット、燻煙剤、燻蒸剤、シートに加工されて、使用されることもある。

## 【0058】

本発明の有害生物防除剤は、本発明化合物を通常0.1~95重量%含有する。製剤化の際に用いられる固体担体としては、例えば粘土類(カオリンクレー、珪藻土、ベントナイト、フバサミクレー、酸性白土等)、合成含水酸化珪素、タルク、セラミック、その他の無機鉱物(セリサイト、石英、硫黄、活性炭、炭酸カルシウム、水和シリカ等)、化学肥料(硫安、燐安、硝安、塩安、尿素等)等の微粉末及び粒状物が挙げられる。

## 【0059】

液体担体としては、例えば芳香族または脂肪族炭化水素類(キシレン、トルエン、アルキルナフタレン、フェニルキシリルエタン、ケロシン、軽油、ヘキサン、シクロヘキサン等)、ハロゲン化炭化水素類(クロロベンゼン、ジクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン等)、アルコール類(メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、ヘキサノール、エチレングリコール等)、エーテル類(ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等)、エステル類(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等)、ニ

トリル類（アセトニトリル、イソブチロニトリル等）、スルホキシド類（ジメチルスルホキシド等）、酸アミド類（N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等）、植物油（大豆油、綿実油等）、植物精油（オレンジ油、ヒソップ油、レモン油等）および水などが挙げられる。

#### 【0060】

ガス状担体としては、例えばブタンガス、フロンガス、液化石油ガス（LPG）、ジメチルエーテル、炭酸ガス等を挙げることができる。

#### 【0061】

界面活性剤としては、例えばアルキル硫酸エステル塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルアリールスルホン酸塩、アルキルアリールエーテル類及びそのポリオキシエチレン化物、ポリエチレングリコールエーテル類、多価アルコールエステル類及び糖アルコール誘導体が挙げられる。

#### 【0062】

その他の製剤用補助剤としては、固着剤、分散剤及び安定剤等、具体的には例えばカゼイン、ゼラチン、多糖類（澱粉、アラビアガム、セルロース誘導体、アルギン酸等）、リグニン誘導体、ベントナイト、糖類、合成水溶性高分子（ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸類等）、PAP（酸性リン酸イソプロピル）、BHT（2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール）、BHA（2-tert-ブチル-4-メトキシフェノールと3-tert-ブチル-4-メトキシフェノールとの混合物）、植物油、鉱物油、脂肪酸及び脂肪酸エステルが挙げられる。

#### 【0063】

樹脂製剤の基材としては、例えば塩化ビニル系重合体、ポリウレタン等を挙げることができる。これらの基材には必要によりフタル酸エステル類（フタル酸ジメチル、フタル酸ジオクチル等）、アジピン酸エステル類、ステアリン酸等の可塑剤が添加されていてもよい。樹脂製剤は該基材中に化合物を通常の混練装置を用いて混練した後、射出成型、押出成型、プレス成型等により成型することにより得られ、必要により更に成型、裁断等の工程を経て、板状、フィルム状、テープ状、網状、ひも状等の樹脂製剤に加工できる。これらの樹脂製剤は、例えば動物用首輪、動物用イヤータッグ、シート製剤、誘引ひも、園芸用支柱として加工される。

#### 【0064】

毒餌の基材としては、例えば穀物粉、植物油、糖、結晶セルロース等が挙げられ、更に必要に応じて、ジブチルヒドロキシトルエン、ノルジヒドロゲアイアレチン酸等の酸化防止剤、デヒドロ酢酸等の保存料、トウガラシ末等の子供やペットによる誤食防止剤、チーズ香料、タマネギ香料ピーナッツオイル等の害虫誘引性香料等が添加される。

#### 【0065】

本発明化合物の有効量を、有害生物に直接、及び／または有害生物の生息場所（植物体、動物体、土壌等）に施用することにより、有害生物を防除することができる。通常、本発明化合物として、本発明の有害生物防除剤の製剤を使用する。

#### 【0066】

本発明の有害生物防除剤を農林害虫の防除に用いる場合は、その施用量は有効成分量として通常1～10000g/haである。乳剤、水和剤、フロアブル剤、マイクロカプセル製剤等は通常有効成分濃度が0.01～1000ppmとなるように水で希釈して使用し、油剤、粉剤、粒剤等は通常そのまま使用する。これらの製剤を有害生物から保護すべき植物に対して直接散布してもよい。これらの製剤を土壌に処理することにより土壌に棲息する有害生物を防除することもでき、またこれらの製剤を植物を植え付ける前の苗床に処理したり、植付時に植穴や株元に処理することもできる。さらに、本発明の有害生物防除剤のシート製剤を植物に巻き付けたり、植物の近傍に設置したり、株元の土壌表面に敷くなどの方法でも施用することができる。

#### 【0067】

本発明の有害生物防除剤を防疫用として用いる場合は、その施用量は空間に適用すると

きは有効成分量として通常  $0.001 \sim 100 \text{ mg/m}^3$  であり、平面に適用するときは  $0.001 \sim 100 \text{ mg/m}^2$  である。乳剤、水和剤、フロアブル剤等は通常有効成分濃度が  $0.01 \sim 10000 \text{ ppm}$  となるように水で希釈して施用し、油剤、エアゾール、燻煙剤、毒餌等は通常そのまま施用し、殺虫線香、電気殺虫マット等は形態に応じて加熱により有効成分を揮散させて施用する。

#### 【0068】

本発明の有害生物防除剤をウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ニワトリ用の家畜、イヌ、ネコ、ラット、マウス等の小動物の外部寄生虫防除に用いる場合は、獣医学的に公知の方法で動物に使用することができる。具体的な使用方法としては、全身抑制 (systemic control) を目的にする場合には、例えば錠剤、飼料混入、坐薬、注射 (筋肉内、皮下、静脈内、腹腔内等) により投与され、非全身的抑制 (non-systemic control) を目的とする場合には、例えば油剤若しくは水性液剤を噴霧する、ポアオン (pour-on) 処理若しくはスポットオン (spot-on) 処理する、シャンプー製剤で動物を洗う又は樹脂製剤を首輪や耳札にして動物に付ける等の方法により用いられる。動物体に投与する場合の本発明化合物の量は、通常動物の体重  $1 \text{ kg}$  に対して、 $0.1 \sim 1000 \text{ mg}$  の範囲である。

#### 【0069】

本発明の有害生物防除剤は他の殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調節剤、共力剤、肥料、土壌改良剤、動物用飼料等と混用又は併用することもできる。

#### 【0070】

かかる他の殺虫剤、殺ダニ剤の有効成分としては、例えば、アレスリン、テトラメスリン、プラレトリン、フェノトリン、レスメトリン、シフェノトリン、ペルメトリン、シペルメトリン、アルファシペルメトリン、ゼータシペルメトリン、デルタメトリン、トラロメトリン、シフルトリン、ベータシフルトリン、シハロトリン、ラムダシハロトリン、フラメトリン、イミプロトリン、エトフェンプロクス、フェンバレレート、エスフェンバレレート、フェンプロパトリン、シラフルオフエン、ビフェントリン、トランスフルスリン、フルシトリネート、タウフルバリネート、アクリナトリン、テフルトリン等のピレスロイド化合物、ジクロロボス、フェニトロチオン、シアノホス、プロフェノホス、スルプロホス、フェントエート、イソキサチオン、テトラクロロビンホス、フェンチオン、クロルピリホス、ダイアジノン、アセフェート、テルブホス、フォレート、クロルエトキシホス、ホスチアゼート、エトプロホス、カズサホス、メチダチオン等の有機燐化合物、プロボキサール、カルバリル、メトキサジアゾン、フェノブカルブ、メソミル、チオジカルブ、アラニカルブ、ベンフラカルブ、オキサミル、アルジカルブ、メチオカルブ等のカーバメート化合物、ルフエヌロン、クロルフルアズロン、ヘキサフルムロン、ジフルベンズロン、トリフルムロン、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、フルアズロン、ノバルロン、トリアズロン等のベンゾイルフェニルウレア化合物、ピリプロキシフェン、メトブレン、ハイドロブレン、フェノキシカルブ等の幼若ホルモン様物質、アセタミプリド、ニテンピラム、チアクロプリド、チアメトキサム、ジノテフラン等のネオニコチノイド系化合物、アセトプロール、エチプロール等のN-フェニルピラゾール系化合物、テブフェノジド、クロマフェノジド、メトキシフェノジド、ハロフェノジド等のベンゾイルヒドラジン化合物、ジアフェンチウロン、ピメトロジン、フロニカミド、トリアザメート、ブプロフェジン、スピノサド、エマメクチン安息香酸塩、クロルフェナピル、インドキサカルブMP、ピリダリル、シロマジン、フェンピロキシメート、テブフェンピラド、トルフェンピラド、ピリダベン、ピリミジフェン、フルアクリピリム、エトキサゾール、フェナザキン、アセキノシル、ヘキシチアゾクス、クロフェンテジン、酸化フェンブタスズ、ジコホル、プロパルギット、エパーメクチン、ミルベメクチン、アミトラズ、カルタップ、ベンスルタップ、チオシクラム、エンドスルファン、スピロジクロフェン、スピロメシフェン及びアザジラクチンがあげられる。

#### 【0071】

かかる他の殺菌剤の有効成分としては、例えば、アゾキシストロビン等のストロビルリン化合物、トリクロホスメチル等の有機リン化合物、トリフルミゾール、ペフラゾエート

、ジフェノコナゾール等のアゾール化合物、フサライド、フルトラニル、バリダマイシン、プロベナゾール、ジクロメジン、ペンシクロン、ダゾメット、カスガマイシン、IBP、ピロキロン、オキシロニック酸、トリシクラゾール、フェリムゾン、メプロニル、EDDP、イソプロチオラン、カルプロパミド、ジクロシメット、フラメトピル、フルジオキシニル、プロシミドン及びジエトフェンカルブがあげられる。

#### 【実施例】

##### 【0072】

以下、本発明を製造例、製剤例および試験例によりさらに詳しく説明するが、本発明は、これらの例のみに限定されるものではない。

まず、本発明化合物の製造例を示す。

##### 【0073】

#### 製造例 1

(1) 水素化ナトリウム (60%油性) 0.5 g を N, N-ジメチルホルムアミド 10 ml に懸濁し、約 0℃ で (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル 1.6 g を N, N-ジメチルホルムアミド 10 ml に溶解した溶液を加えた。これを室温まで昇温してから N, N-ジメチルホルムアミドを加え、全量を 20 ml とした。(このようにして得られた溶液を以下溶液 A と記す。)

(2) 1-ブロモ-3-クロロプロパン 0.23 g を N, N-ジメチルホルムアミド 1 ml に溶解し、ここに溶液 A 2 ml を加え、室温で 4 時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-(3-クロロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (1) と記す。) 0.13 g を得た。

本発明化合物 (1)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.13~2.21 (6H, m)、2.42~2.53 (2H, m)、3.62 (2H, t)

##### 【0074】

#### 製造例 2

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ブロモ-3-クロロ-2-メチルプロパン 0.17 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-(3-クロロ-2-メチルプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (2) と記す。) 0.11 g を得た。

本発明化合物 (2)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.26 (3H, d)、1.84~1.92 (1H, m)、2.21~2.38 (4H, m)、2.43~2.57 (2H, m)、3.43~3.68 (2H, m)

##### 【0075】

#### 製造例 3

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ブロモ-4-クロロブタン 0.17 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-(4-クロロブチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (3) と記す。) 0.17 g を得た。

本発明化合物 (3)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.82~1.94 (4H, m)、1.96~2.06 (2H, m)、2.13~2.21 (2H, m)、2.41~2.53 (2H, m)、2.54 (2H, t)

##### 【0076】

#### 製造例 4

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 2-ブロモメチル-1, 1-ジクロロシクロプロパン 0.21 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-(2, 2-ジクロロシクロ

プロピルメチル) - 2 - (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (4) と記す。) 0.12 g を得た。

本発明化合物 (4)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.42 (1H, t)、1.81~1.96 (2H, m)、2.08~2.12 (1H, m)、2.22~2.29 (2H, m)、2.43~2.58 (3H, m)

【0077】

#### 製造例 5

マロノニトリル 2.00 g および 1-ブロモ-3, 3, 3-トリフルオロプロパン 13.0 g を N, N-ジメチルホルムアミド 10 ml に溶解させ、氷浴で冷却した。ここへ炭酸カリウム 8.4 g をゆっくりと添加後、そのまま室温まで昇温しながら 30 時間攪拌した。反応液に氷水および酢酸エチルを加えて攪拌後分液し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2, 2-ビス (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (5) と記す。) 4.75 g を得た。

本発明化合物 (5)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.26~2.33 (4H, m)、2.52~2.61 (4H, m)

【0078】

#### 製造例 6

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりにヨードエタン 0.16 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-エチル-2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (6) と記す。) 0.03 g を得た。

本発明化合物 (6)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.32 (3H, t)、2.06 (2H, q)、2.14~2.22 (2H, m)、2.42~2.57 (2H, m)

【0079】

#### 製造例 7

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ヨードプロパン 0.17 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-プロピル-2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (7) と記す。) 0.05 g を得た。

本発明化合物 (7)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.08 (3H, t)、1.68~1.77 (2H, m)、1.91~1.96 (2H, m)、2.13~2.21 (2H, m)、2.43~2.57 (2H, m)

【0080】

#### 製造例 8

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ヨードブタン 0.18 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-ブチル-2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (8) と記す。) 0.11 g を得た。

本発明化合物 (8)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.98 (3H, t)、1.46 (2H, q)、1.63~1.72 (2H, m)、1.94~2.03 (2H, m)、2.18~2.23 (2H, m)、2.43~2.55 (2H, m)

【0081】

#### 製造例 9

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ヨードペンタン 0.20 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-ペンチル-2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (9) と記す。) 0.10 g を得た。

## 本発明化合物 (9)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.91~1.02 (3H, m)、1.38~1.45 (4H, m)、1.61~1.74 (2H, m)、1.93~2.07 (2H, m)、2.13~2.24 (2H, m)、2.47~2.54 (2H, m)

## 【0082】

## 製造例 10

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ヨードヘキサン0.21gを用い、製造例1(2)に準じて、2-ヘキシル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(10)と記す。)0.13gを得た。

## 本発明化合物 (10)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.87 (3H, t)、1.28~1.43 (6H, m)、1.63~1.72 (2H, m)、1.91~2.01 (2H, m)、2.13~2.19 (2H, m)、2.42~2.51 (2H, m)

## 【0083】

## 製造例 11

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ヨードヘプタン0.23gを用い、製造例1(2)に準じて、2-ヘプチル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(11)と記す。)0.10gを得た。

## 本発明化合物 (11)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.90 (3H, t)、2.21~2.42 (8H, m)、2.59~2.68 (2H, m)、1.91~2.02 (2H, m)、2.12~2.28 (2H, m)、2.41~2.53 (2H, m)

## 【0084】

## 製造例 12

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ヨードオクタン0.24gを用い、製造例1(2)に準じて、2-オクチル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(12)と記す。)0.17gを得た。

## 本発明化合物 (12)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.89 (3H, t)、1.21~1.42 (10H, m)、1.63~1.71 (2H, m)、1.92~1.97 (2H, m)、2.13~2.19 (2H, m)、2.41~2.58 (2H, m)

## 【0085】

## 製造例 13

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ブロモノナン0.21gを用い、製造例1(2)に準じて、2-ノニル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(13)と記す。)0.19gを得た。

## 本発明化合物 (13)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.89 (3H, t)、1.21~1.48 (12H, m)、1.68~1.77 (2H, m)、1.96~2.03 (2H, m)、2.19~2.23 (2H, m)、2.43~2.61 (2H, m)

## 【0086】

## 製造例 14

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ブロモデカン0.22gを用い、製造例1(2)に準じて、2-デシル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(14)と記す。)0.15gを得た。

## 本発明化合物 (14)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.89 (3H, t)、1.22~1.48 (14H, m)、1.68~1.74 (2H, m)、1.97~2.01 (2H, m)、2.18~2.22 (2H, m)、2.48~2.63 (2H, m)

## 【0087】

## 製造例 15

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりにアシルブロマイド 0.12 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-アシル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (15) と記す。) 0.12 g を得た。

本発明化合物 (15)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.12~2.21 (2H, m)、2.43~2.58 (2H, m)、2.75 (2H, d)、5.43~5.51 (2H, m)、5.84~5.95 (1H, m)

【0088】

## 製造例 16

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ブロモ-3-ブテン 0.14 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-(3-ブテニル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (16) と記す。) 0.13 g を得た。

本発明化合物 (16)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.06~2.10 (2H, m)、2.21~2.24 (2H, m)、2.45~2.58 (4H, m)、5.14~5.23 (2H, m)、5.81~5.85 (1H, m)

【0089】

## 製造例 17

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに 1-ブロモ-3, 4, 4-トリフルオロ-3-ブテン 0.19 g を用い、製造例 1 (2) に準じて、2-(3, 3, 4-トリフルオロ-3-ブテニル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (17) と記す。) 0.19 g を得た。

本発明化合物 (17)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.23~2.27 (4H, m)、2.52~2.61 (2H, m)、2.69~2.80 (2H, m)

【0090】

## 製造例 18

ジメチルスルホキシド 5 ml に 2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル 0.4 g 及びシクロプロピルメチルブロマイド 0.5 g を溶解し、炭酸カリウム 0.41 g を加えて室温で 5 時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-シクロプロピルメチル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (18) と記す。) 0.34 g を得た。

本発明化合物 (18)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.40 (2H, dd)、0.72 (2H, dd)、0.91~0.98 (1H, m)、1.95 (2H, d)、2.16~2.23 (2H, m)、2.43~2.52 (2H, m)

【0091】

## 製造例 19

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりにシクロブチルメチルブロマイド 0.44 g を用い、製造例 18 に準じて、2-シクロブチルメチル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (19) と記す。) 0.34 g を得た。

。

本発明化合物 (19)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.81~1.92 (2H, m)、1.93~2.01 (2H, m)、2.06 (2H, d)、2.11~2.19 (2H, m)、2.22~2.27 (2H, m)、2.41~2.52 (2H, m)、2.61~2.69 (1H, m)



## 【0092】

## 製造例 20

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに 2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルトリフルオロメタンスルホン酸エステル 0.44 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (20) と記す。) 0.34 g を得た。

本発明化合物 (20)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.34~2.41 (2H, m)、2.55~2.63 (2H, m)、2.74 (2H, t)、5.88 (1H, t)

## 【0093】

## 製造例 21

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (2, 2, 2-トリフルオロエチル) トリフルオロメタンスルホン酸エステル 1.2 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (21) と記す。) 0.2 g を得た。

本発明化合物 (21)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.30~2.38 (2H, m)、2.51~2.69 (2H, m)、2.87 (2H, q)

## 【0094】

## 製造例 22

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル) トリフルオロメタンスルホン酸エステル 1.3 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (22) と記す。) 0.2 g を得た。

本発明化合物 (22)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.35~2.41 (2H, m)、2.57~2.67 (2H, m)、2.81 (2H, t)

## 【0095】

## 製造例 23

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロプロピル) トリフルオロメタンスルホン酸エステル 2.4 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (23) と記す。) 0.34 g を得た。

本発明化合物 (23)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.36~2.40 (2H, m)、2.57~2.68 (2H, m)、2.81~2.91 (2H, m)、4.85~5.03 (1H, m)

## 【0096】

## 製造例 24

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロプロピル) トリフルオロメタンスルホン酸エステル 1.5 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (24) と記す。) 2.0 g を得た。

本発明化合物 (24)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.37~2.41 (2H, m)、2.58~2.80 (2H, m)、2.86 (2H, t)

## 【0097】

## 製造例 25

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (2-フルオロエチル) トルエンスルホン酸エステル 2.2 g を用い、製造例 18 に準じて、2- (2-フルオロエチル) -2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (25) と記す。) 0.4 g を得た。

本発明化合物 (25)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm) : 2.29~2.34 (2H, m)、2.40~2.42 (2H, m)、2.46~2.59 (2H, m)、4.82 (2H, dt)

【0098】

製造例 26

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに 1H、1H、2H、2H-パーフルオロオクチルヨージド 4.7 g を用い、製造例 18 に準じて、2- (1H、1H、2H、2H-パーフルオロオクチル) -2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (26) と記す。) 0.6 g を得た。

本発明化合物 (26)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm) : 2.27~2.35 (4H, m)、2.47~2.61 (4H, m)

【0099】

製造例 27

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに 3-ブロモ-1-プロピン 1.2 g を用い、製造例 18 に準じて、2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) -2- (2-プロピニル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (27) と記す。) 0.94 g を得た。

本発明化合物 (27)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm) : 2.34~2.39 (2H, m)、2.44~2.57 (3H, m)、3.00 (2H, s)

【0100】

製造例 28

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに (ブロモメチル) シクロプロパン 1.8 g を用い、製造例 18 に準じて、2-シクロヘキシルメチル-2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (28) と記す。) 0.64 g を得た。

本発明化合物 (28)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm) : 1.14~1.71 (5H, m)、1.80~1.98 (4H, m)、2.06~2.11 (2H, m)、2.21~2.28 (2H, m)

【0101】

製造例 29

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに 3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチルヨージド 2.8 g を用い、製造例 18 に準じて、2- (3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル) -2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (29) と記す。) 1.8 g を得た。

本発明化合物 (29)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm) : 2.12~2.20 (4H, m)、2.23~2.59 (4H, m)

【0102】

製造例 30

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに 1-ブロモ-2-クロロ-4-ヨード-1、2-トリフルオロブタン 2.8 g を用い、製造例 18 に準じて、2- (4-ブロモ-3-クロロ-3, 4, 4-トリフルオロブチル) -2- (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル (以下、本発明化合物 (30) と記す。) 0.89 g を得た。

本発明化合物 (30)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.30~2.65 (7H, m)、2.74~2.83 (1H, m)

【0103】

製造例31

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル1.6gを用い、製造例18に準じて、2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(31)と記す。)0.54gを得た。

本発明化合物(31)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.36~2.41 (2H, m) 2.57~2.65 (2H, m)、2.84 (2H, t)、6.07 (1H, tt)

【0104】

製造例32

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル1.6gを用い、製造例18に準じて、2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(32)と記す。)0.70gを得た。

本発明化合物(32)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.36~2.41 (2H, m)、2.58~2.65 (2H, m)、2.84 (2H, t)、6.06 (1H, tt)

【0105】

製造例33

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに2-(パーフルオロデシル)エチルヨージド3.2gを用い、製造例18に準じて、2-(2-(2-(パーフルオロデシル)エチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(33)と記す。))2.0gを得た。

本発明化合物(33)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.66~2.80 (4H, m)、3.23~3.29 (4H, m)

【0106】

製造例34

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに2-(パーフルオロオクチル)エチルヨージド2.4gを用い、製造例18に準じて、2-(2-(2-(パーフルオロオクチル)エチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(34)と記す。))0.1gを得た。

本発明化合物(34)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.27~2.35 (4H, m)、2.45~2.58 (4H, m)

【0107】

製造例35

シクロプロピルメチルブロマイドの代わりに1-ブロモ-4-ヨード-1, 1, 2, 2-テトラフルオロブタン1.7gを用い、製造例18に準じて、2-(4-ブロモ-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(35)と記す。)0.53gを得た。

本発明化合物(35)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.26~2.36 (4H, m)、2.47~2.61 (4H, m)

【0108】

## 製造例 36

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 4-ヨード-1, 1, 1, 2-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)ブタン 1.7 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2, 4, 4, 4-テトラフルオロ-3-(トリフルオロメチル)ブチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル (以下、本発明化合物 (36) と記す。) 0.53 g を得た。

本発明化合物 (36)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.23~2.32 (4H, m)、2.47~2.61 (4H, m)

【0109】

## 製造例 37

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 5-ヨード-1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロペンタン 1.6 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロペンチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル (以下、本発明化合物 (37) と記す。) 0.23 g を得た。

本発明化合物 (37)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.28~2.35 (4H, m)、2.48~2.61 (4H, m)

【0110】

## 製造例 38

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 1H、1H、2H、2H-パーフルオロヘキシルヨージド 2.1 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-ノナフルオロヘキシル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル (以下、本発明化合物 (38) と記す。) 0.64 g を得た。

本発明化合物 (38)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.26~2.35 (4H, m)、2.50~2.62 (4H, m)

【0111】

## 製造例 39

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 3-フルオロプロピルプロマイド 1.4 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(3-フルオロプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル

(以下、本発明化合物 (39) と記す。) 0.62 g を得た。

本発明化合物 (39)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.05~2.11 (2H, m)、2.13~2.19 (2H, m)、2.20~2.28 (2H, m)、3.49~2.59 (2H, m)、4.57 (2H, dt)

【0112】

## 製造例 40

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 1, 2-ジブromoエタン 5.6 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(2-ブromoエチル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル (以下、本発明化合物 (40) と記す。) 2.3 g を得た。

本発明化合物 (40)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.23~2.30 (2H, m)、2.49~2.58 (4H, m)、3.59 (2H, t)

【0113】

## 製造例 41

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 1, 3-ジブromoプロパン 5.6 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(3-ブromoプロピル)-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル (以下、本発明化合物 (41) と記す。) 2.3 g を得た。

本発明化合物 (41)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.16~2.30 (6H, m)、2.47~2.59 (2H, m)、3.51 (2H, t)

【0114】

製造例42

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに5-ブロモ-1-ペンテン7.2gを用い、製造例18に準じて、2-(4-ペンテニル)-2-(3,3,3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(42)と記す。)6.0gを得た。

本発明化合物 (42)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.78~1.85 (2H, m)、1.97~2.01 (2H, m)、2.18~2.23 (4H, m)、2.46~2.57 (2H, m)、5.06~5.12 (2H, m)、5.72~5.82 (1H, m)

【0115】

製造例43

2-(2,2-ジメチルプロピル)マロノニトリル400mgをN,N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解させ、氷浴で冷却した。ここへ水素化ナトリウム(60%油性)120mgをゆっくりと添加した。水素ガスの発生がおさまった後、1-ブロモ-3,3,3-トリフルオロプロパン750mgをゆっくりと滴下し、そのまま室温まで昇温しながら12時間攪拌した。反応液に氷水および酢酸エチルを加えて攪拌後分液し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-(2,2-ジメチルプロピル)-2-(3,3,3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(43)と記す。)437mgを得た。

本発明化合物 (43)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.21 (9H, s)、1.92 (2H, s)、2.19~2.23 (2H, m)、2.49~2.61 (2H, m)

【0116】

製造例44

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに3-ブロモ-2-メチルプロペン0.12gを用い、製造例1(2)に準じて、2-(2-メチル-2-プロペニル)-2-(3,3,3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(44)と記す。)0.20gを得た。

本発明化合物 (44)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.97 (3H, s)、2.19~2.24 (2H, m)、2.48~2.60 (2H, m)、2.71 (2H, s)、5.16 (2H, d)

【0117】

製造例45

1-ブロモ-3-クロロプロパンの代わりに1-ブロモ-2-メチルプロパン0.14gを用い、製造例1(2)に準じて、2-(2-メチルプロピル)-2-(3,3,3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(45)と記す。)0.16gを得た。

本発明化合物 (45)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 1.17 (6H, d)、1.89 (2H, d)、2.08~2.18 (1H, m)、2.19~2.23 (2H, m)、2.47~2.62 (2H, m)

【0118】

製造例46

ジメチルスルホキシド10mlに2-(2,2,3,4,4,4-ヘキサフルオロブチル)マロノニトリル1.2g及び2-クロロ-1,4-ジブロモ-1,1,2-トリフル

オロブタン 1.5 g を溶解し、炭酸カリウム 0.7 g を加えて室温で 5 時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-(4-ブromo-3-クロロ-3,4,4-トリフルオロブチル)-2-(2,2,3,4,4,4-ヘキサフルオロブチル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(46)と記す。)0.14 g を得た。

本発明化合物(46)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.39~2.93 (6H, m)、4.86~5.02 (1H, m)

【0119】

製造例 47

ジメチルスルホキシド 5 ml に 2-(2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチル)マロノニトリル 0.56 g 及びアリルプロマイド 0.30 g を溶解し、炭酸カリウム 0.28 g を加えて室温で 5 時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-(アリル)-2-(2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(47)と記す。)0.15 g を得た。

本発明化合物(47)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.75 (2H, t)、2.87 (2H, d)、5.47~5.72 (2H, m)、5.86~6.21 (2H, m)

【0120】

製造例 48

シクロプロピルメチルプロマイドの代わりに 1-ヨード-4,4,4-トリフルオロブタン 1.2 g を用い、製造例 18 に準じて、2-(4,4,4-トリフルオロブチル)-2-(3,3,3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(48)と記す。)1.0 g を得た。

本発明化合物(48)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.00~2.11 (4H, m)、2.21~2.32 (4H, m)、2.48~2.59 (2H, m)

【0121】

製造例 49

ジメチルスルホキシド 30 ml に (2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル 14.6 g を溶解し、炭酸カリウム 5.5 g を加えた。さらに、ジメチルスルホキシド 10 ml に溶解したマロノニトリル 2.6 g をゆっくりと滴下し、室温で 3 時間攪拌した。さらに (2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル 7.0 g、炭酸カリウム 2.7 g を加え、1 時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。得られた留分を濃縮、クロロホルムで洗浄し、2,2-ビス(2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(49)と記す。)0.13 g を得た。

本発明化合物(49)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 3.00 (4H, t)、6.07 (2H, tt)

【0122】

製造例 50

N,N-ジメチルホルムアミド 50 ml にマロノニトリル 7.5 g を溶解し、炭酸カリウム 10.4 g を加えた。室温で 1 時間攪拌し、N,N-ジメチルホルムアミド 20 ml

に溶解した(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル10.0gをゆっくりと滴下し、一晚攪拌した。その後、反応混合物を水に注加し、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。得られた留分をクロロホルムで洗浄し、2, 2-ビス(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(50)と記す。)0.08gを得た。

本発明化合物(50)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.89 (4H, t)、5.88 (2H, tt)

【0123】

製造例51

ジメチルスルホキシド10mlに2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)マロノニトリル1.4g及びヨードペンタン1.0gを溶解し、炭酸カリウム0.70gを加えて室温で3時間攪拌した。その後、反応混合物に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して、2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)-2-ペンチルマロノニトリル(以下、本発明化合物(51)と記す。)0.90gを得た。

本発明化合物(51)

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 0.94 (3H, t)、1.37~1.45 (4H, m)、1.71~1.79 (2H, m)、2.07~2.11 (2H, m)、2.76 (2H, t)、6.06 (1H, tt)

【0124】

製造例52

ジメチルスルホキシド40mlに3, 3, 3-トリフルオロマロノニトリル3.2g、ジブロモメタン7.0g、炭酸カリウム5.5gを加え、室温で18時間攪拌した。その後、反応混合物を水に注加し、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-ブロモメチル-2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)マロノニトリル(以下、本発明化合物(52)と記す。)3.4gを得た。

本発明化合物(52)


$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.32~2.38 (2H, m)、2.50~2.59 (2H, m)、3.72 (2H, s)

【0125】

以下、本発明の化合物を具体的に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0126】




式(I)で示される化合物;



なお、式中のR及びQの組合せを(表1)~(表3)に示す。

【0127】

【表 1】

化合物番号	R	Q
1	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
2	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Cl}$
3	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
4	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	
5	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_3$
6	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_3$
7	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_3$
8	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
9	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
10	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
11	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
12	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
13	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
14	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
15	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}=\text{CH}_2$
16	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
17	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}=\text{CF}_2$
18	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	
19	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	
20	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CHF}_2$
21	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_3$
22	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CF}_3$
23	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CHF}\text{CF}_3$
24	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
25	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{F}$

【0128】



【表 2】

化合物番号	R	Q
26	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
27	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{C}\equiv\text{CH}$
28	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$  \begin{array}{c}  \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\  \diagup \quad \diagdown \\  \text{CH} \quad \text{CH}_2 \\  \diagdown \quad \diagup \\  \text{CH}_2-\text{CH}_2  \end{array}  $
29	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
30	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CFC1CBrF}_2$
31	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$
32	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$
33	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
34	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
35	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CBrF}_2$
36	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}(\text{CF}_3)_2$
37	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
38	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$
39	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{F}$
40	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{Br}$
41	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$
42	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
43	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{C}(\text{CH}_3)_3$
44	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$
45	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
46	$\text{CF}_2\text{CHF}\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CFC1CF}_2\text{Br}$
47	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	$\text{CH}=\text{CH}_2$
48	$\text{CH}_2\text{CF}_3$	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$
49	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	$\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$
50	$\text{CF}_2\text{CHF}_2$	$\text{CF}_2\text{CHF}_2$

【0129】

【表 3】


化合物番号	R	Q
51	CF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
52	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	Br

## 【0130】

次に、本発明化合物の中間体の製造につき、参考製造例を示す。

## 【0131】

参考製造例 1




マロノニトリル 27.6 g を N, N-ジメチルホルムアミド 50 ml に溶解し、炭酸カリウム 27.6 g を加え、室温で 1 時間攪拌した。その後、1-ブロモ-3, 3, 3-トリフルオロプロパン 17.7 g と N, N-ジメチルホルムアミド 20 ml との混合物を加え、さらに 1 時間攪拌した。その後、反応混合物を水に注加し、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル 11.3 g を得た。

2-(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) マロノニトリル

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, TMS) δ (ppm): 2.32~2.42 (2H, m)、2.43~2.52 (2H, m)、3.91 (1H, t)

## 【0132】

参考製造例 2




トリフルオロメタンスルホン酸無水物 100 ml を 0℃ で 2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノール 79.2 g にゆっくりと滴下した。室温にて 1 時間攪拌し、さらに 60℃ で 3 時間攪拌した。その後、反応混合物を氷水に反応混合物を水に注加し、ジエチルエ

ーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮し、(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル100gを得た。

(2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル  
 $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 4.73 (2H, t)、5.97 (1H, t t)

【0133】

参考製造例3




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 2-トリフルオロエタノール2.0gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 2-ペンタフルオロエチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル1.2gを得た。

(2, 2, 2-トリフルオロエチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル  
 $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 4.71 (2H, q)

【0134】

参考製造例4




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロパノール4.8gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル4.1gを得た。

(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 4.72 (2H, t)

【0135】

参考製造例5




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブタノール14.1gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル16.5gを得た。

(2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 4.71~4.79 (2H, m)、4.92~5.11 (1H, m)

【0136】

参考製造例6




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブタノール8.0 gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル10 gを得た。

(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル

$^1\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>, TMS)  $\delta$  (ppm): 4.80 (2H, t)

【0137】

参考製造例7




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンタノール139 gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル187 gを得た。

(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル

$^1\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>, TMS)  $\delta$  (ppm): 4.82 (2H, m)、6.04 (1H, tt)

【0138】

参考製造例8




2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノールの代わりに2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプタノール16.6 gを用い、参考製造例2に準じて、(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル20.5 gを得た。

(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル

$^1\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>, TMS)  $\delta$  (ppm): 4.83 (2H, t)、6.07 (1H, tt)

【0139】

参考製造例9



ジメチルスルホキシド20 mlに(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)トリフルオロメタンスルホン酸エステル14.6 gを溶解し、炭酸カリウム5.5 gを加えた。ジメチルスルホキシド10 mlに溶解したマロノニトリル2.6 gをゆっくりと滴下し、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水に注加し、


ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)マロノニトリル 2.0 g を得た。

2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7-ドデカフルオロヘプチル)マロノニトリル

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.91 (2H, dt)、4.14 (1H, t)、6.05 (1H, tt)

【0140】

参考製造例 10



ジメチルスルホキシド 15 ml に (2, 2, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル)トリフルオロメタンスルホン酸 8.0 g を溶解し、炭酸カリウム 6.9 g を加えた。ジメチルスルホキシド 15 ml に溶解したマロノニトリル 5.0 g をゆっくりと滴下し、室温で 3 時間攪拌した。反応混合物を水に注加し、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(2, 2, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル)マロノニトリル 2.0 g を得た。

2-(2, 2, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル)マロノニトリル

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  (ppm): 2.79~2.91 (2H, m)、4.15 (1H, t)、4.84~5.04 (1H, m)

【0141】

次に製剤例を示す。なお、部は重量部を表す。また、本発明化合物は前記の化合物番号で表す。

【0142】

製剤例 1

本発明化合物 (1) ~ (52) 9 部を、キシレン 37.5 部およびジメチルホルムアミド 37.5 部に溶解し、これにポリオキシエチレンステリルフェニルエーテル 10 部およびドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム 6 部を加え、よく攪拌混合して乳剤を得る。

【0143】

製剤例 2

本発明化合物 (1) ~ (52) 40 部にソルポール 5060 (東邦化学登録商標名) 5 部を加え、よく混合して、カープレックス # 80 (塩野義製薬登録商標名、合成含水酸化ケイ素微粉末) 32 部、300 メッシュ珪藻土 23 部を加え、ジュースミキサーで混合して、水和剤を得る。

【0144】

製剤例 3

本発明化合物 (1) ~ (52) 3 部、合成含水酸化珪素微粉末 5 部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 5 部、ペントナイト 30 部およびクレー 57 部を加え、よく攪拌混合し、ついでこれらの混合物に適量の水を加え、さらに攪拌し、増粒機で製粒し、通風乾燥して粒剤を得る。

【0145】

製剤例 4

本発明化合物 (1) ~ (52) 4.5 部、合成含水酸化珪素微粉末 1 部、凝集剤としてドリレス B (三共社製) 1 部、クレー 7 部を乳鉢でよく混合した後にジュースミキサーで攪拌混合する。得られた混合物にカットクレー 86.5 部を加えて、充分攪拌混合し、粉剤を得る。

## 【0146】

## 製剤例 5

本発明化合物 (1) ~ (52) 10 部、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートアンモニウム塩 50 部を含むホワイトカーボン 35 部及び水 55 部を混合し、湿式粉碎法で微粉碎することにより、製剤を得る。

## 【0147】

## 製剤例 6

本発明化合物 (1) ~ (52) 0.5 部をジクロロメタン 10 部に溶解し、これをアイソパーM (イソパラフィン：エクソン化学登録商標名) 89.5 部に混合して油剤を得る。

## 【0148】

## 製剤例 7

本発明化合物 (1) ~ (52) 0.1 部、ネオチオゾール (中央化成株式会社) 49.9 部をエアゾール缶に入れ、エアゾールバルブを装着した後、25 部のジメチルエーテル及び 25 部の LPG を充填し、振とうを加え、アクチュエータを装着することにより油性エアゾールを得る。

## 【0149】

## 製剤例 8

本発明化合物 (1) ~ (52) 0.6 部、BHT 0.01 部、キシレン 5 部、脱臭灯油 3.39 部および乳化剤 {アトモス 300 (アトモスケミカル社登録商標名)} 1 部を混合溶解したものと、蒸留水 50 部とをエアゾール容器に充填し、バルブ部分を取り付け、該バルブを通じて噴射剤 (LPG) 40 部を加圧充填して、水性エアゾールを得る。

## 【0150】

次に、本発明化合物が有害生物防除剤の有効成分として有効であることを試験例により示す。なお、本発明化合物は前記の化合物番号で表す。

## 【0151】

## 試験例 1

製剤例 5 により得られた本発明化合物 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(22)、(23)、(24)、(28)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(46)、(48)、(49) および (51) の製剤を有効成分濃度が 500 ppm となるように希釈し、試験用薬液を調製した。

一方、ポリエチレンカップに培土ボンソル 2 号 (住友化学工業 (株) 製) 50 g を入れて種子を 10 ~ 15 粒播種し、第 2 本葉が展開するまで生育させた後、高さを 5 cm に切り揃えたイネに対し、上記のように調製した試験用薬液を 20 ml / カップの割合で散布した。イネに散布処理された薬液が乾燥した後、供試虫逃亡防止のためのプラスチックカップに入れ、トビイロウンカの初齢幼虫を 30 頭放して蓋をし、その後温室内 (25℃) に静置した。トビイロウンカの幼虫を放してから 6 日後に当該イネに寄生するトビイロウンカの数进行调查した。

その結果、本発明化合物 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(22)、(23)、(24)、(28)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(46)、(48)、(49) および (51) の処理において、寄生する虫数は 3 頭以下であった。

あった。

## 【0152】

## 試験例 2

製剤例 5 により得られた本発明化合物 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)、(10)、(11)、(17)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(27)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(46)、(47)、(48)、(49)、(50)

)、(51) および (52) の製剤を有効成分濃度が 500 ppm となるように水で希釈し、試験用薬液を調製した。

直径 5.5 cm のポリエチレンカップの底に同大の濾紙を敷き、上記試験用薬液 0.7 ml を濾紙上に滴下し、餌としてショ糖 30 mg を均一に入れた。該ポリエチレンカップ内にイエバエ (*Musca domestica*) 雌成虫 10 頭を放ち、蓋をした。24 時間後にイエバエの生死を調査し死虫率を求めた。

その結果、本発明化合物 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)、(10)、(11)、(17)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(27)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(46)、(47)、(48)、(49)、(50)、(51) および (52) の処理においては死虫率 90% 以上を示した。

#### 【0153】

##### 試験例 3

製剤例 5 により得られた本発明化合物 (3)、(4)、(5)、(9)、(10)、(17)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(27)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(46)、(47)、(48)、(50) および (52) の製剤を有効成分濃度が 500 ppm となるように水で希釈し、試験用薬液を調製した。

直径 5.5 cm のポリエチレンカップの底に同大の濾紙を敷き、上記試験用薬液 0.7 ml を濾紙上に滴下し、餌としてショ糖 30 mg を均一に入れた。該ポリエチレンカップ内にチャバネゴキブリ (*Blattella germanica*) 雄成虫 2 頭を放ち、蓋をした。6 日後にチャバネゴキブリの生死を調査し死虫率を求めた。

その結果、本発明化合物 (3)、(4)、(5)、(9)、(10)、(17)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(27)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(46)、(47)、(48)、(50) および (52) の処理においては死虫率 100% を示した。

#### 【0154】

##### 試験例 4

製剤例 5 により得られた本発明化合物 (1)、(3)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(20)、(21)、(22)、(23)、(28)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(43)、(46)、(47)、(48)、(49) および (51) の製剤を有効成分濃度が 500 ppm となるように水で希釈し、試験用薬液を調製した。

上記試験用薬液 0.7 ml をイオン交換水 100 ml に加えた (有効成分濃度 3.5 ppm)。該液中にアカイエカ (*Culex pipiens pallens*) 終令幼虫 20 頭を放ち、1 日後にその生死を調査し死虫率を求めた。

その結果、本発明化合物 (1)、(3)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(20)、(21)、(22)、(23)、(28)、(29)、(30)、(31)、(32)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(43)、(46)、(47)、(48)、(49) および (51) の処理においては死虫率 90% 以上を示した。

【書類名】 要約書


【要約】

【課題】

有害生物に対して、優れた防除効力を有する化合物及び該化合物による有害生物の防除方法を提供すること。

【解決手段】

式 (I)



〔式中、RはC1-C4フルオロアルキル基を表し、Qはハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-C6アルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルケニル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいC2-C6アルキニル基又はハロゲン原子で置換されていてもよいC3-C7シクロアルキル基又はハロゲン原子で置換されていてもよい(C3-C7シクロアルキル) C1-C4アルキル基を表す。〕で示されるニトリル化合物は有害生物に対して優れた防除効力を有する。

【選択図】 なし



特願 2003-431908

出願人履歴情報

識別番号 [000002093]

1. 変更年月日 1990年 8月28日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号  
氏 名 住友化学工業株式会社
2. 変更年月日 2004年10月 1日  
[変更理由] 名称変更  
住所変更  
住 所 東京都中央区新川二丁目27番1号  
氏 名 住友化学株式会社